

آبسه مغزی

تجمع چرک ناشی از يك عفونت باکتریال در مغز یا خارجی‌ترین لایه از سه لایه غشایی که مغز و نخاع را می‌پوشانند.

علائم شایع

علائم زیر به تدریج در عرض چند ساعت ظاهر می‌شوند. این علائم شبیه علائم تومور یا سکتة مغزی هستند:

درد در پشت و کمر، در صورتی که عفونت در غشای پوشاننده نخاع باشد

سردرد، تهوع و استفراغ، ضعف، بی‌حسی یا فلج در يك طرف بدن، راه رفتن نامنظم، تشنج، تب، منگی، گیجی، یا حالت هذیانی، مشکل در صحبت کردن

علل

منشأ اولیه عفونت باکتریایی که موجب بروز آبسه مغزی یا اپیدورال می‌شود را اغلب نمی‌توان پیدا کرد. اما سه منشأ زیر شایع‌ترین هستند:

1- عفونتی که از جمجمه به درون گسترش می‌یابد، مثلاً استنومیلیت (عفونت استخوان و مغز استخوان)،

2- عفونتی که به دنبال شکستگی جمجمه آغاز و گسترش می‌یابد.

3- عفونتی که از سایر بخش‌های بدن که دچار عفونت شدند، مثلاً ریه‌ها، پوست، یا دریچه‌های قلب، از راه خون گسترش می‌یابد.

عوامل افزایش دهنده خطر:

صدمه به سر، وجود يك بیماری که مقاومت بدن را کاهش داده باشد، به خصوص دیابت

بروز اخیر يك عفونت، به خصوص در اطراف بینی، چشم‌ها و صورت

بیماری که دستگاه ایمنی‌اش به علت بیماری (مثلاً ایدز) یا داروها سرکوب شده است. تزریق وریدی مواد مخدر

پیشگیری:

در صورت بروز هر گونه عفونت در بدن به پزشک مراجعه کنید، به خصوص اگر عفونت در اطراف بینی یا صورت باشد (مثلاً عفونت گوش یا آبسه دندان). با مراجعه زود هنگام می‌توان از گسترش عفونت جلوگیری کرد.

در هر گونه فعالیتی که خطر صدمه به سر وجود دارد، از کلاه ایمنی و سایر وسایل حفاظتی استفاده نمایید

پیش آگهی:

با تشخیص و درمان زودهنگام معمولاً خوب می‌شود.

عوارض احتمالی:

بروز حملات تشنج، اغماء و مرگ، در صورتی که درمان انجام نشود.

اصول کلی درمان:

آزمایشات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشند: آزمایش خون، آزمایش مایع نخاع، نوار مغز، سی‌تی‌اسکن، عکس‌برداری از جمجمه

نیاز به مراقبت ویژه وجود دارد.


درمان طبی یا جراحی بستگی به محل آبسه دارد. معمولاً احتیاج به دادن آنتی‌بیوتیک و نیز جراحی برای تخلیه آبسه است. سایر درمان‌هایی که ممکن است لازم شوند عبارتند از مایعات داخل وریدی و تهویه مکانیکی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
بیمارستان شهید کامیاب

Brain Abscess

آبسه مغزی



کمیته آموزش بیمارستان سوانح شهید کامیابی

تهیه و تنظیم: فندهاری

کد پمفلت / NU/15:1	سال تهیه: 91
گروه هدف: بیماران	بازنگری: 95

منبع: برونر و سودارث پرستاری

رژیم غذایی:

به هنگام بستری در بیمارستان، امکان دارد تزریق مایعات داخل وریدی ضروری باشد. پس از درمان، یک رژیم عادی و متعادل داشته باشید.

در چه شرایطی باید به پزشک خود مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان یکی از علائم آبسه مغزی یا اپی‌دورال را دارید.

اگر تب به 38/3 درجه سانتیگراد یا بیشتر افزایش یابد.

اگر دچار علائم جدید و غیرقابل کنترل شده اید.

داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است

عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

پرونده کار را

به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم .
دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم .
بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم .
مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کند

دکتر علی شریعتی.

داروها:

آنتی‌بیوتیک برای 4-6 هفته جهت مبارزه با عفونت داروهای ضد تشنج برای پیشگیری از بروز حملات تشنجی

کورتیکواستروئیدها برای کاهش تورم مغزی پس از عمل جراحی

فعالیت:

هنگامی که در بیمارستان هستید نیاز به استراحت

در تخت دارید. پس از طی دوران نقاهت 2-3

هفته‌ای، به هر اندازه که قدرت بدنی و احساس

خوب بودن به شما اجازه می‌دهد، فعالیت داشته

باشید.



Parastar